

Романов А.С., Шарахова Е.Ф. За пределами консенсуса: экспертная оценка фармакотерапии эпилепсии через призму многоуровневой верификации. *Эпилепсия и пароксизмальные состояния*. 2026; 18 (2): 112–121. <https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2026.276>.

Romanov A.S., Sharakhova E.F. Beyond consensus: expert assessment of epilepsy pharmacotherapy through the lens of multi-level verification. *Epilepsia i paroksizmal'nye sostoania / Epilepsy and Paroxysmal Conditions*. 2026; 18 (2): 112–121 (in Russ.). <https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2026.276>.

Приложение 1. Анкета экспертной оценки противоэпилептических препаратов

Supplement 1. Questionnaire for expert evaluation of antiepileptic drugs

Общие данные			
Врачебная специальность _____			
Опыт работы эпилептологом _____			
Назначаете и корректируете противосудорожную терапию			
Нет ☐	Иногда ☐	Часто ☐	
Поток пациентов с эпилепсией			
Менее 10% ☐	от 11% до 50% ☐	более 50% ☐	
Должность			
Врач ☐	Заведующий отделением ☐	Зав. кафедрой ☐	
Ученое звание			
Нет ☐	к.м.н. ☐	д.м.н. ☐	
Выступаете с докладами, спонсируемыми фармацевтическими компаниями			
Нет ☐	Раз в год и менее ☐	Несколько раз в год ☐	

Определите частоту приема взрослых пациентов с соответствующим типом эпилепсии в Вашей практике

Фокальная	Генерализованная	Комбинированная: фокальная и генерализованная	Неуточненная
более 75% ☐ от 25% до 75 ☐ менее 25% ☐	более 75% ☐ от 25% до 75 ☐ менее 25% ☐	более 75% ☐ от 25% до 75 ☐ менее 25% ☐	более 75% ☐ от 25% до 75 ☐ менее 25% ☐

Оцените эффективность и безопасность лекарственного препарата по 10-балльной шкале согласно одному из вариантов ответа:

- 1 – применим на старте терапии как наиболее эффективный, степень риска низкая
- 2 – применим на старте терапии как наиболее эффективный, степень риска средняя
- 3 – применим на старте терапии как наиболее эффективный, степень риска повышенная
- 4 – применим в альтернативной монотерапии и/или ранней политерапии, степень риска низкая
- 5 – применим в альтернативной монотерапии и/или ранней политерапии, степень риска средняя
- 6 – применим в альтернативной монотерапии и/или ранней политерапии, степень риска повышенная
- 7 – только политерапия, степень риска низкая
- 8 – только политерапия, степень риска средняя
- 9 – только политерапия, степень риска повышенная
- 0 – неприменим по разным причинам

Препарат (МНН)	Тип эпилепсии			
	Фокальная	Генерализованная	Фокальная и генерализованная	Неуточненная
Вальпроевая				
Карбамазепин				
Ламотриджин				
Леветирацетам				
Габапентин				
Топирамат				
Окскарбазепин				
Эсликарбазепин				
Лакосамид				
Перампанел				
Клоназепам				
Зонисамид				
Фенобарбитал				

Препарат (МНН)	Тип эпилепсии			
	Фокальная	Генерализованная	Фокальная и генерализованная	Неуточненная
Бриварацетам				
Прегабалин				
Фенитоин				
Этосуксимид				
Руфинамид				
Клобазам				
Бензобарбитал				
Фенозановая				