

Романов А.С., Шарахова Е.Ф. За пределами консенсуса: экспертная оценка фармакотерапии эпилепсии через призму многоуровневой верификации. *Эпилепсия и пароксизмальные состояния*. 2026; 18 (2): 112–121. <https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2026.276>.

Romanov A.S., Sharakhova E.F. Beyond consensus: expert assessment of epilepsy pharmacotherapy through the lens of multi-level verification. *Epilepsia i paroksizmal'nye sostoania / Epilepsy and Paroxysmal Conditions*. 2026; 18 (2): 112–121 (in Russ.). <https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2026.276>.

Приложение 2. Критерии оценки компетентности экспертов

Supplement 2. Criteria for assessing the competence of experts

№	Фактор компетентности	Вес, %	Шкала оценки	Обоснование
1	Поток пациентов с эпилепсией	25	1 балл: <10% (низкая клиническая практика) 3 балла: 11–50% (умеренная практика) 5 баллов: >50% (высокая нагрузка)	Эксперты с большим потоком пациентов демонстрируют более широкий опыт дифференциальной диагностики форм эпилепсии, знание нюансов применения ПЭП при коморбидных состояниях и способны оценивать отдаленные эффекты терапии
2	Частота назначения ПЭП	20	1 балл: не назначает 2 балла: иногда 4 балла: часто	Регулярная практика назначения обеспечивает актуальность знаний о фармакокинетике препаратов, понимание межлекарственных взаимодействий и позволяет нивелировать НПР
3	Опыт работы эпилептологом	25	1 балл: <5 лет 3 балла: 5–10 лет 5 баллов: >11 лет	Длительный стаж коррелирует с участием в смене терапевтических парадигм, наблюдением отдаленных исходов терапии и глубиной понимания эволюции резистентных форм
4	Участие в спонсируемых мероприятиях	10	0,5 балла: несколько раз в год 1 балл: раз в год 2 балла: не участвует	Участие в образовательных мероприятиях повышает осведомленность о новых препаратах; полное отсутствие контактов может ограничивать доступ к актуальным данным

№	Фактор компетентности	Вес, %	Шкала оценки	Обоснование
5	Ученая степень	10	1 балл: отсутствует 2 балла: к.м.н. 3 балла: д.м.н.	Наличие степени свидетельствует о системном аналитическом мышлении, опыте работы с доказательной базой и умении критически оценивать исследования
6	Руководящая должность	10	1 балл: врач 3 балла: зав. отделением 5 баллов: зав. кафедрой	Руководящая позиция предполагает ответственность за терапевтические решения коллектива, участие в разработке локальных протоколов и формуляров – интеграцию клинического опыта с организационными решениями

Примечание. ПЭП – противоэпилептический препараты; НПР – нежелательные побочные реакции.